



## מחלקת ילדים הדסה הר – הצופים הדרכה לשחרור ילד המקבל אינהלציות וונטולין (Ventolin)

### להורים שלום.

- ילדיכם משתחרר הביתה בשעה טובה, אך צריך להמשיך לקבל את התרופה בבית.
- מינון ותדירות התרופה ייקבע ע"י הרופא בלבד ואין לעבור את המינון הדרוש.
  - יש להמשיך לקחת את התרופה לאורך כל התקופה שהרופא רשם.
  - בכל מקרה של הופעת תופעות שאינן שכיחות, יש להתייעץ עם הרופא המטפל.

### ארובנט – Aerovent (אינהלציה).

- התרופה מרחיבה את הסמפונות וכך גורמת להקלה בנשימה.
- אופן המתן: יש למדוד באמצעות מזרק 0.5-1 סמ"ק של Aerovent (תלוי במינון שהומלץ על ידי הרופא) ולהשלים עם מי מלח פיסיולוגיים (סליין) לכמות של 3 סמ"ק. לעיתים התרופה תינתן ביחד עם וונטולין ואז יש להפחית את כמות מי המלח.
- יש להכניס את החומר למסכת האינהלציה, להצמיד לפנים (על הפה והאף להיות מכוסים) ולהפעיל את המכשיר כשהכוסית במצב אנכי.
- התרופה מסתיימת כאשר האדים היוצאים מן המסכה מסתיימים.
- התרופה עלולה לגרום לשיעול, עלייה בייצור ליחה, סחרחורת, חולשה, בחילות וכאבי בטן. (במבוגרים תוארו תופעות של טשטוש ראייה ועצירת שתן).
- שימו לב: במקרה של הופעת תופעות לוואי יש להתייעץ עם רופא.

בברכה ובבריאות  
צוות מחלקת ילדים א', הדסה הר הצופים

אפריל 2008

מידע זה נועד להשכלה בלבד. אינו מהווה חוות דעת רפואית ואינו תחליף לייעוץ מקצועי רפואי.