



מחלקת ילדים הדסה הר – הצופים הדרכה לשחרור ילד המקבל אינהלציות ארובנט (Aerovent)

להורים שלום.

- ילדיכם משתחרר הביתה בשעה טובה, אך צריך להמשיך לקבל את התרופה בבית.
- מינון ותדירות התרופה ייקבע ע"י הרופא בלבד ואין לעבור את המינון הדרוש.
 - יש להמשיך לקחת את התרופה לאורך כל התקופה שהרופא רשם.

ארובנט – Aerovent

- באינהלציה: התרופה מרחיבה את הסמפונות וכך גורמת להקלה בנשימה.
- התרופה עלולה לגרום לשיעול, עלייה בייצור ליחה, סחרחורת, חולשה, בחילות וכאבי בטן. (במבוגרים תוארו תופעות של טשטוש ראייה ועצירת שתן).
- אופן המתן באינהלציה: יש למדוד באמצעות מזרק 0.5-1 סמ"ק של Aerovent (תלוי במינון שהומלץ על ידי הרופא) ולהשלים עם מי מלח פיסיולוגיים (סליין) לכמות של 3 סמ"ק. לעיתים התרופה תינתן ביחד עם וונטולין ואז יש להפחית את כמות מי המלח.
- יש להכניס את החומר למסכת האינהלציה, להצמיד לפנים (על הפה והאף להיות מכוסים) ולהפעיל את המכשיר כשהכוסית במצב אנכי.
- התרופה מסתיימת כאשר האדים היוצאים מן המסכה מסתיימים.
- שימו לב: במקרה של הופעת תופעות לוואי יש להתייעץ עם רופא.

בברכה ובבריאות
צוות מחלקת ילדים

עודכן ב אפריל 2008

מידע זה נועד להשכלה בלבד. אינו מהווה חוות דעת רפואית ואינו תחליף לייעוץ מקצועי רפואי.